

Protocollo: TUMORE DEL COLON-RETTO

Selezione della coorte

Criteri di eleggibilità

Tutti i ricoveri, avvenuti in strutture italiane, tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006 con diagnosi principale o secondaria di tumore maligno colo-rettale primitivo (ICD-9 CM: 153-154)

Criteri di esclusione

- 1) ricoveri di pazienti non tracciabili (codice identificativo paziente ministero diverso da A e B);
- 2) ricoveri con diagnosi di recidiva di tumore maligno colo-rettale (V10.00, V10.05, V10.06, V10.9) fra i primi ricoveri dell'anno (vanno individuati i pazienti con ricoveri multipli nel 2006 con stessa diagnosi, di questi va individuato il primo ricovero del 2006 ed escluso nel caso abbia segnalata una recidiva);
- 3) ricoveri preceduti, nei 5 anni precedenti, da ricoveri con diagnosi di tumore maligno colo-rettale (ICD-9-CM 153-154, 159.0, V10.00, V10.05, V10.06, V10.9).

Fonti informative

La fonte dei dati è SDO.

Intervalli di osservazione

Possono essere distinti in:

- intervallo di reclutamento: 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006;
- intervallo di ricostruzione della storia clinica pregressa: 5 anni precedenti la data di ricovero (differenza tra date di ricovero \geq 5anni);
- intervallo di follow up per mortalità ospedaliera e a 30 giorni: 1 gennaio 2006 - 31 gennaio 2007
- intervallo di follow up per l'individuazione di recidive: 5 anni successivi la data di ricovero (differenza tra date di ricovero $<$ 5anni)

Indicatore di outcome a livello di ASL/provincia di residenza:

a) proporzione di casi operati

– *Numeratore*

Numero di pazienti con intervento chirurgico principale o secondario per tumore maligno del colon-retto (partendo da pazienti incidenti 2006) (primo intervento; codici ICD-9-CM: 45.42, 45.7, 48.5, 48.6)

– *Denominatore*

Numero di pazienti della coorte 2006 selezionata.

b) proporzione di casi con recidiva (casi con recidiva individuati tra quelli che hanno avuto l'intervento)

– *Numeratore*

Numero di pazienti con diagnosi di recidiva entro i 5 anni successivi alla data di ricovero per intervento chirurgico principale o secondario per tumore maligno del colon-retto (primo intervento; codici ICD-9-CM: 45.42, 45.7, 48.5, 48.6)

– *Denominatore*

Numero di pazienti con intervento chirurgico principale o secondario per tumore maligno del colon-retto (primo intervento; codici ICD-9-CM: 45.42, 45.7, 48.5, 48.6)

c) mortalità ospedaliera dopo intervento chirurgico:

– *Numeratore*

Numero di pazienti al punto a) con stato in vita deceduto nel ricovero per intervento.

– *Denominatore*

Numero di pazienti con intervento chirurgico principale o secondario per tumore maligno del colon-retto (primo intervento; codici ICD-9-CM: 45.42, 45.7, 48.5, 48.6).

d) mortalità a 30 giorni dopo intervento chirurgico:

– *Numeratore*

Numero di pazienti al punto a) con stato in vita deceduto entro 30 giorni dalla data del ricovero per intervento.

– *Denominatore*

– Numero di pazienti con intervento chirurgico principale o secondario per tumore maligno del colon-retto (primo intervento; codici ICD-9-CM: 45.42, 45.7, 48.5, 48.6).