

## Protocollo: **TUMORE DELLO STOMACO**

### **Selezione della coorte**

#### Criteria di eleggibilità

Tutti i ricoveri, avvenuti in strutture italiane, tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006 con diagnosi principale o secondaria di tumore maligno dello stomaco primitivo (ICD-9 CM: 151)

#### Criteria di esclusione

- 1) ricoveri di pazienti non tracciabili (codice identificativo paziente ministero diverso da A e B );
- 2) ricoveri con diagnosi di recidiva di tumore maligno dello stomaco (V10.00, V10.04, V10.9) fra i primi ricoveri dell'anno (vanno individuati i pazienti con ricoveri multipli nel 2006 con stessa diagnosi, di questi va individuato il primo ricovero del 2006 ed escluso nel caso abbia segnalata una recidiva);
- 3) ricoveri preceduti, nei 5 anni precedenti, da ricoveri con diagnosi di tumore maligno dello stomaco (ICD-9-CM 151, V10.00, V10.04, V10.9).

#### Fonti informative

La fonte dei dati è SDO.

#### Intervalli di osservazione

Possono essere distinti in:

- intervallo di reclutamento: 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006;
- intervallo di ricostruzione della storia clinica pregressa: 5 anni precedenti la data di ricovero (differenza tra date di ricovero  $\geq 5$ anni);
- intervallo di follow up per mortalità ospedaliera e a 30 giorni: 1 gennaio 2006 - 31 gennaio 2007
- intervallo di follow up per l'individuazione di recidive: 5 anni successivi la data di ricovero (differenza tra date di ricovero  $< 5$ anni)

#### Indicatore di outcome a livello di ASL/provincia di residenza:

##### **a) proporzione di casi operati**

###### – *Numeratore*

Numero di pazienti con intervento chirurgico principale o secondario per tumore maligno dello stomaco (partendo da pazienti incidenti 2006) (primo intervento; codici ICD-9-CM: 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9)

###### – *Denominatore*

Numero di pazienti della coorte 2006 selezionata.

##### **b) proporzione di casi con recidiva (casi con recidiva individuati tra quelli che hanno avuto l'intervento)**

###### – *Numeratore*

Numero di pazienti con diagnosi di recidiva entro i 5 anni successivi alla data di ricovero per intervento chirurgico principale o secondario per tumore maligno dello stomaco (primo intervento; codici ICD-9-CM: 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9)

###### – *Denominatore*

Numero di pazienti con intervento chirurgico principale o secondario per tumore maligno dello stomaco (primo intervento; codici ICD-9-CM: 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9)

**c) mortalità ospedaliera dopo intervento chirurgico:**

– *Numeratore*

Numero di pazienti al punto a) con stato in vita deceduto nel ricovero per intervento.

– *Denominatore*

Numero di pazienti con intervento chirurgico principale o secondario per tumore maligno dello stomaco (primo intervento; codici ICD-9-CM: 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9)

**d) mortalità a 30 giorni dopo intervento chirurgico:**

– *Numeratore*

Numero di pazienti al punto a) con stato in vita deceduto entro 30 giorni dalla data del ricovero per intervento.

– *Denominatore*

Numero di pazienti con intervento chirurgico principale o secondario per tumore maligno dello stomaco (primo intervento; codici ICD-9-CM: 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9)